

# Přípravný kurz na Maturitu z Matematiky

## II. Lineární a kvadratická funkce, lineární a kvadratická rovnice

Tomáš Neustupa



FAKULTA  
STROJNÍ  
ČVUT V PRAZE

## II.1. Lineární funkce

### Obecný předpis lineární funkce

$$y = ax + b.$$

Jaký je definiční obor, obor hodnot a graf v závislosti na hodnotách  $a$  a  $b$ ?

## II.1. Lineární funkce

### Obecný předpis lineární funkce

$$y = ax + b.$$

Jaký je definiční obor, obor hodnot a graf v závislosti na hodnotách  $a$  a  $b$ ?


Zápisy přímky. Co je to směrový a normálový vektor.

# Konkrétní příklady

## Příklad 1

26 Přidejte ke každé přímce (26.1–26.3) její analytické vyjádření (A–E).

26.1



A)  $y = -x + 2$


B)  $x + 2y - 4 = 0$

C)  $x = 2 + 2t,$   
 $y = 1 + t, t \in \mathbf{R}$

D)  $x = t,$   
 $y = 2, t \in \mathbf{R}$

E)  $x = 2,$   
 $y = t, t \in \mathbf{R}$


26.2



D)  $x = t,$   
 $y = 2, t \in \mathbf{R}$

E)  $x = 2,$   
 $y = t, t \in \mathbf{R}$

26.3



## Konkrétní příklady

### Příklad 2

max. 4 body

25 Ke každému bodu  $A$  (25.1–25.2) přiřadte interval (A–F), v němž leží hodnota jeho chybějící souřadnice  $a_1$ .

25.1 Jsou dány body  $A[a_1; 4]$  a  $B[7; -2]$ .

Střed  $S$  úsečky  $AB$  má obě souřadnice stejné.

\_\_\_\_\_

25.2 Jsou dány body  $A[a_1; 0]$ ,  $B[3; -2]$  a  $C[1; -1]$ .

Přímky  $AB$  a  $BC$  jsou na sebe kolmé.

\_\_\_\_\_

A)  $(-7; -5)$

B)  $(-5; -2)$

C)  $(-2; 1)$

D)  $(1; 3)$

E)  $(3; 6)$


F) v žádném z uvedených intervalů

# Konkrétní příklady

## Příklad 3

### VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 26

V mřížových bodech čtvercové sítě leží body  $A$ ,  $B$  a počáteční i koncové body orientovaných úseček, které představují umístění vektorů  $\vec{u}$ ,  $\vec{n}$ .



(CZVV)

max. 3 body

26 Přifaďte ke každé přímce (26.1–26.3) její obecnou rovnici (A–E).

26.1 přímka  $p$  určená bodem  $A$  a normálovým vektorem  $\vec{n}$  \_\_\_\_\_

26.2 přímka  $q$  určená bodem  $A$  a směrovým vektorem  $\vec{u}$  \_\_\_\_\_

26.3 přímka  $r$  procházející body  $A$ ,  $B$  \_\_\_\_\_

A)  $3x - 2y + 7 = 0$

B)  $3x + 2y - 1 = 0$

C)  $2x + 3y - 4 = 0$

D)  $2x - 3y - 5 = 0$


E)  $2x - 3y + 8 = 0$

# Konkrétní příklady

## Příklad 4

### VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 21

V kartézské soustavě souřadnic  $Oxy$  jsou umístěny vektory  $\vec{u}$  a  $\vec{v}$ .  
(Počáteční i koncové body umístění těchto vektorů jsou v mřížových bodech.)



(CZVV)

2 body

21 Směrovým vektorem přímky  $p$  je součet vektorů  $\vec{u}$  a  $\vec{v}$ .

Který z následujících vektorů je normálovým vektorem přímky  $p$ ?

- A)  $\vec{a} = (2; 1)$
- B)  $\vec{b} = (2; -1)$
- C)  $\vec{c} = (-1; -2)$
- D)  $\vec{d} = (1; -2)$
- E) žádný z uvedených vektorů

# Konkrétní příklady

## Příklad 5


VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Pro rovnostranný trojúhelník  $OPQ$  se základnou  $OP$  platí:

Vrchol  $O$  leží v počátku kartézské soustavy souřadnic  $Oxy$ ,

vrchol  $P$  je průsečík přímky  $p: y = -0,5x + 3$  se souřadnicovou osou  $x$ ,

vrchol  $Q$  leží na přímce  $q: 2x - y - 2 = 0$ .



(CZVV)

max. 3 body

8

- 8.1 V kartézské soustavě souřadnic  $Oxy$  zakreslete a popište bod  $P$ .
- 8.2 V kartézské soustavě souřadnic  $Oxy$  zakreslete a popište přímku  $q$ .
- 8.3 Určete obě souřadnice vrcholu  $Q[q_1; q_2]$ .



## II.1. Lineární funkce

### Obecný předpis lineární funkce

$$y = ax + b.$$

Jaký je definiční obor, obor hodnot a graf v závislosti na hodnotách  $a$  a  $b$ ?

Zápisy přímky. Co je to směrový a normálový vektor.

Řešení soustavy rovnic a co to je geometricky.

## Konkrétní příklady

### Příklad 6

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Jedna korunová mince váží 3,6 gramu a jedna pětikorunová mince váží 4,8 gramu.  
V kasičce jsou pouze korunové a pětikorunové mince. Dohromady mají hodnotu 81 korun  
a váží 120 gramů.

(CZVV)

max. 3 body

- 14 Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočítejte celkový počet mincí  
v kasičce.

V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení** (popis neznámých, sestavení rovnice,  
resp. soustavy rovnic, řešení a odpověď).

## Konkrétní příklady

### Příklad 7 a 8

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Během prvních 5 dnů se vyrobilo denně v průměru o čtvrtinu výrobků méně, než se vyrobilo v každém z 10 následujících dnů. Celkem se tak za 15 dnů vyrobilo 2 200 výrobků.

(CZVV)

max. 3 body

- 14 Užitím rovnice nebo soustavy rovnic určete celkový počet výrobků vyrobených za prvních 5 dnů.

V záznamovém archu uveďte celý **postup řešení** (popis neznámých, sestavení rovnice, resp. soustavy rovnic, řešení a odpověď).

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

Na stůl jsme rozložili dvanáct kartiček. Na každé z nich je zapsáno jedno číslo. Aritmetický průměr těchto čísel je 25. Když odebereme dvě kartičky s čísly, jejichž rozdíl je 26, na stole zůstane deset kartiček, a to s čísly, jejichž aritmetický průměr je 24.

(CZVV)

max. 2 body

- 13 Určete čísla na obou kartičkách, které odebereme.

## II.2. Kvadratická funkce

### Obecný předpis kvadratické funkce

$$y = ax^2 + bx + c.$$

Jaký je definiční obor, obor hodnot a graf v závislosti na hodnotách  $a$ ,  $b$  a  $c$ ?

## II.2. Kvadratická funkce

### Obecný předpis kvadratické funkce

$$y = ax^2 + bx + c.$$

Jaký je definiční obor, obor hodnot a graf v závislosti na hodnotách  $a$ ,  $b$  a  $c$ ?

Tj. odpozorováno: Koeficient  $a$  je "zodpovědný" za to kam směřují větve paraboly (nahoru či dolů),  $c$  za posunutí grafu ve směru osy  $y$  a koeficient  $b$  za "průniky grafu s osou  $x$ ".

## II.2. Kvadratická funkce

### Obecný předpis kvadratické funkce

$$y = ax^2 + bx + c.$$

Jaký je definiční obor, obor hodnot a graf v závislosti na hodnotách  $a$ ,  $b$  a  $c$ ?

Tj. odpozorováno: Koeficient  $a$  je "zodpovědný" za to kam směřují větve paraboly (nahoru či dolů),  $c$  za posunutí grafu ve směru osy  $y$  a koeficient  $b$  za "průniky grafu s osou  $x$ ".

Jak je to s rovnicí  $y = ax^2 + bx + c$ ? Co to znamená geometricky a jaké jsou možnosti?

## II.2. Kvadratická funkce

### Obecný předpis kvadratické funkce

$$y = ax^2 + bx + c.$$

Jaký je definiční obor, obor hodnot a graf v závislosti na hodnotách  $a$ ,  $b$  a  $c$ ?

Tj. odpozorováno: Koeficient  $a$  je "zodpovědný" za to kam směřují větve paraboly (nahoru či dolů),  $c$  za posunutí grafu ve směru osy  $y$  a koeficient  $b$  za "průniky grafu s osou  $x$ ".

Jak je to s rovnicí  $y = ax^2 + bx + c$ ? Co to znamená geometricky a jaké jsou možnosti?


Tj. vidíme, že parabola může mít žádný, jeden či dva průniky s osou  $x$  (počty řešení kvadratické rovnice).

# Konkrétní příklady

## Příklad 9

### VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 17

Kvadratická funkce  $g$  s definičním oborem  $\mathbb{R}$  je dána grafem.



(CZV)

2 body

17 Které z následujících vyjádření je předpisem funkce  $g$ ?





- A)  $y = x^2 + 7x - 10$
- B)  $y = -x^2 + 7x + 10$
- C)  $y = -(x + 2)(x + 5)$
- D)  $y = (x - 2)(x + 5)$
- E)  $y = (x - 2)(5 - x)$



# Konkrétní příklady

## Příklad 10

25 Každému z grafů (25.1–25.4) kvadratické funkce přiřaďte odpovídající předpis (A–F). max. 4 body



- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| A) $y = (x - 3)(x + 1)$ | D) $y = (x + 3)(x + 1)$ |
| B) $y = (x - 3)(x - 1)$ | E) $y = (x + 3)(x - 1)$ |
| C) $y = (3 - x)(x + 1)$ | F) $y = (x + 3)(1 - x)$ |

## Konkrétní příklady

### Příklad 11

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Odměna 25 200 korun se rozdělila rovným dílem mezi všechny brigádníky.  
Kdyby bylo o 5 brigádníků více, na každého by vyšla odměna o 1000 korun menší.

(CZVV)

**max. 3 body**

14 Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočtete, kolik korun dostal každý brigádník.


V **záznamovém archu** uveďte celý **postup řešení** (popis neznámých, sestavení rovnice, resp. soustavy rovnic, řešení a odpověď).

# Konkrétní příklady

## Příklad 12

### VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 19

V kartézské soustavě souřadnic Oxy jsou vyznačeny dva mřížové body A, B. Grafem funkce  $h$  je parabola s vrcholem A procházející bodem B.



(CZV)

2 body

19 Jaký je předpis funkce  $h$ ?

A)  $y = -2x + 5$

B)  $y = x^2 - 8x + 13$

C)  $y = -x^2 + 4x - 3$

D)  $y = \frac{x-1}{3-x}$

E)  $y = \frac{3x-9}{x-5}$

## Konkrétní příklady

Příklad 13 a 14

- 9 Funkce  $g: y = x(x - 36)$  je definována pro všechna  $x \in \mathbb{R}$ .  
Vrcholem grafu funkce  $g$  je bod  $V[v_1; v_2]$ .

**Určete první souřadnici  $v_1$  vrcholu  $V$ .**

**1 bod**

- 6 V oboru  $\mathbb{R}$  řešte:

$$\frac{2}{x} = \frac{5}{x^2 - 2x} - 1$$

**V záznamovém archu uveďte celý postup řešení.**

**max. 2 body**

## Konkrétní příklady

### Příklad 15 a 16

- 7** Kvadratická funkce má předpis  $y = 2x^2 - 3x$ . Její graf protíná přímka  $p$  ve dvou různých bodech  $P[p_1; 9]$  a  $Q[q_1; 9]$ . **max. 2 body**
- Vypočtěte souřadnice  $p_1, q_1$  bodů  $P, Q$ .**

- 5** V oboru  $\mathbb{R}$  řešte: **max. 3 body**
- $$x \cdot \left( \frac{2x - 6}{x - 6} - 1 \right) = \frac{6 - 7x}{6 - x}$$

## Konkrétní příklady

### Příklad 17

#### VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Aleš a Blanka začali současně číst knihu, která má 240 stran. Aleš četl každý den stejný počet stran. Blanka četla denně o 4 strany více než Aleš, a to včetně pátku, kdy knihu dočetla. Aleš pak pokračoval oba víkendové dny, než knihu dočetl.

(CZVV)

**max. 3 body**

**14** Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočtete, kolik stran knihy četl denně Aleš.

**V záznamovém archu** uveďte celý **postup řešení** (popis neznámých, sestavení rovnice, resp. soustavy rovnic, řešení a odpověď).